



Развитие психической зависимости
Желание испытать состояния опьянения, но нет еще проявления физического дискомфорта (я в любой момент могу остановиться, иллюзия, что человек сам управляет своим состоянием)



Развитие химической зависимости
Возникает, когда организм включает ПАВ в процесс обмена веществ и уже не может без них нормально работать. Начинается «ломка» - наркотик нужен чтобы человек чувствовал себя хорошо

Юридическая ответственность

Употребление ПАВ- денежный штраф или 15 суток лишения свободы

Приобретение, хранение, изготовление:

В значительном размере – до 3 лет лишения свободы

В крупном размере- от 3 до 10 лет лишения свободы

В особо крупном размере – от 10 до 15 лет лишения свободы

Производство, сбыт или пересылка – от 4 до 8 лет лишения свободы

В образовательных учреждениях, на объектах спорта, транспорта, в сети интернет – от 5 до 12 лет лишения свободы

В крупном размере от 10 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации



Определить взрослый ты или ребенок - очень просто



ВСЕГДА ПОМНИ

У «зависимых» нет друзей – есть такие же «зависимые»



У «зависимых» нет здоровья – есть много заболеваний



У «зависимых» нет денег – есть потребность в ежедневной «дозе»



У «зависимых» нет цели в жизни – есть существование в поисках очередной «дозы»



Стадии формирования зависимости от ПАВ

1. Начало приема ПАВ
2. Стадия эксперимента (попробую все)
3. Употребление наркотиков в компании
4. Стадия первичного употребления ПАВ
5. Повышение дозы приема ПАВ
6. Патологическое пристрастие к ПАВ

Каннабиноиды (марихуана, гашиш)



Эйфория, разговорчивость, сильный голод и жажда, покраснение глаз, обострение восприятия цвета и звука)



Нарушения памяти, паранойя, бронхит, рак легких

Курительные смеси



Беспричинный хохот, неспособность сосредоточиться, нарушение восприятия мира



Психические расстройства, рак легких

Амфетамин (первитин, эфедрон, метамфетамин)



Расширение зрачков, эйфория, гиперактивность, болтливость, отсутствие чувства голода, вспыльчивость



Риск инсульта, поражение йодом, красным фосфором, риск инфаркта, нервное истощение

Опиаты (героин, дезоморфин, опиум, метадон, маковая соломка)



Растянутая речь, стремление к уединению, бледность кожи, снижение иммунитета



Почечная недостаточность, пародонтоз, разрушение печени, импотенция, заболевание вен